

PHARMAZIE

FAM-Texte / Text zum ausgewählten Unterpunkt

KADCYLA 100 mg Plv.z.Her.e.Inf.-Lösungskonz.
P 02 589 385 Arzneimittel, Verschr.pflicht

1 St ROCHE

Taxe-EK: 1.654,49

Taxe-VK: 1.986,71

✓ ANWENDUNGSGEBIETE (INDIKATIONEN)

1. Brustkrebs im Frühstadium (EBC – Early Breast Cancer):

Das Arzneimittel wird als Einzelsubstanz zur adjuvanten Behandlung bei erwachsenen Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium angewendet, die nach einer neoadjuvanten Taxan-basierten und HER2-gerichteten Therapie eine invasive Resterkrankung in der Brust und/oder den Lymphknoten aufweisen.

2. Metastasierter Brustkrebs (MBC – Metastatic Breast Cancer):

Das Arzneimittel wird als Einzelsubstanz zur Behandlung bei erwachsenen Patienten mit HER2-positivem, inoperablem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs angewendet, die zuvor, einzeln oder in Kombination, Trastuzumab und ein Taxan erhalten haben. Die Patienten sollten entweder

- eine vorherige Behandlung gegen die lokal fortgeschrittene oder metastasierte Erkrankung erhalten haben oder
- ein Rezidiv während oder innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der adjuvanten Behandlung entwickelt haben.

Hinweise zu den Anwendungsgebieten

Um Fehler bei der Behandlung mit dem Arzneimittel zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Etiketten der Durchstechflaschen überprüft werden, um sicherzustellen, dass es sich bei dem Arzneimittel, das zubereitet und angewendet werden soll, um das vorliegende Arzneimittel (Trastuzumab Emtansin) handelt und nicht um Trastuzumab.